

Mini-Pe®

G03AC01

Mini-Pe® is a contraceptive. Mini-pills.

Active substances

Norethisteron.

Application

Mini-Pe® anvendes som svangerskabsforebyggende middel. Midlet indeholder det kvindelige kønshormon

Dosage

Findes som tabletter.

- Behandlingen begyndes på menstruationens 1. dag eller en hvilken som helst dag til og med den 5. blødningsdag. Der tages 1 tablet i døgnet uden pauser i menstruationsperioden. Det er meget vigtigt at tage tabletten regelmæssigt, dvs. på samme tidspunkt hver dag, fx om aftenen.
- Hvis behandlingen startes på den 1. blødningsdag, virker tabletten straks.
- Hvis den første tablet ikke tages på 1. blødningsdag men senere, er der ikke fuld beskyttelse fra starten, og man skal benytte anden præventionsform (kondom, pessar eller sæddræbende creme) de første 7 dage af behandlingen.
- Hvis der går mere end ca. 27 timer mellem indtagelsen af 2 tabletter, er metoden ikke længere sikker. Hvis det sker, skal man straks tage 1 tablet og derefter fortsætte med 1 tablet i døgnet. Samtidig må man i de næste 7 dage anvende anden form for prævention, fx kondom.

Side effects

Hyppeghed	Bivirkninger
Almindelige. Højest 10 ud af 100 personer får bivirkningen.	Brystspænding. Menstruationsforstyrrelser, Udebleven menstruation.
Ikke almindelige. Højest 1 ud af 100 personer får bivirkningen.	Depression.
Ikke kendt.	Godartet svulst i leveren*.

* Godartede svulster kan i nogle tilfælde ses i forbindelse med brugen af minipiller. Risikoen øges jo længere tid, man bruger minipiller, og kan i alvorlige tilfælde resultere i indre blødning, hvis svulsten sprænger.

Ondartede svulster er set i ekstremt sjældne tilfælde og kun ved brug af p-piller, der samtidig indeholder østrogen.

Læs generelt om bivirkninger

Should not be used

- Mini-Pe® bør ikke anvendes, hvis du har brystkræft eller kræft i livmoderen.
- Hvis man har blodprop i venerne eller dårligt fungerende lever, bør midlet heller ikke anvendes.
- Desuden må midlet ikke anvendes, hvis man bløder fra skeden uden kendt årsag.

Special warnings

- Hvis man har opkastning eller diarré, kan virkningen svigte, og anden form for prævention må anvendes.
- Hvis menstruationen udebliver i mere end 6 uger, bør der foretages en graviditetstest.
- Kontakt lægen, hvis der opstår kraftige mavesmerter, evt. med blødningsforstyrrelser. Dette kan være et symptom på graviditet uden for livmoderen.
- Midlet skal anvendes med forsigtighed ved synsforstyrrelser, migrænelignende hovedpine eller hvis man har øget risiko for blodpropper (fx hvis man er storryger, overvægtig, har diabetes eller forhøjet blodtryk).

Using other medicines

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

- Ritonavir og nevirapin (HIV-medicin), nogle epilepsimidler (fx phenytoin og carbamazepin), rifampicin (tuberkulosemiddel), rifabutin (antibiotikum), bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne) og naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Mini-Pe®.
- Mini-Pe® kan desuden hæmme virkningen af orale antidiabetika (tabletter mod diabetes).

Pregnancy

Må ikke anvendes.

Læs mere om gravide og medicin

breastfeeding

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om ammende og medicin

Blood donor

Må tappes.

Læs mere om bloddonorer og medicin

effect

- Virker især ved at påvirke slimen i livmoderhalsen, så sædcellens passage vanskeliggøres.
- Halveringstiden i blodet ($T_{1/2}$) er 6-8 timer.

Pharmaceutical forms

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,35 mg norethisteron.

excipients

Andre:

Lactose

Business

Pfizer

Gaskets, prices, grants and delivery

Tilskud	Udlevering	Dispenseringsform og styrke	Pakning	Pris i kr.
	Recept	Tabletter 0,35 mg	84 stk. (3 x 28) (blister)	47,90

Læs mere om tilskud

Læs mere om udlevering

substitution


Se generelt om substitutionsregler

Tabletter 0,35 mg kan substitueres med:
Norethisteron "Paranova" (Parallelimport), Norethisteron, 0,35 mg
Noriday (Parallelimport), Norethisteron, 0,35 mg

Photo and identification



▶ **Tabletter 0,35 mg**



revision Date

2018-01-04. However, prices are valid as of. Monday, January 29, 2018

There may be differences between the preparation description and the information in the package leaflet. This is because min.medicin.dk may have supplemented the Danish Medicines Agency and the producer's product information with other sources. Min.medicin.dk is fully responsible for the preparation specifications.

The content of min.medicin.dk can not replace the advice or treatment of a health professional (eg doctor, pharmacist, nurse or pharmacist).

switch, Contact

✉ kontakt@medicin.dk

☎ 39 27 44 88

About min.medicin.dk

Min.medicin.dk is a website about medicine, diseases, studies and treatment written in an easily accessible language. The information is targeted to you who are patient, relatives or employees in the healthcare sector. Min.medicin.dk is a tool used by social assistants, social workers and other staff working in the care sector, at homes and the like.

© 2018 Dansk Lægemiddelinformation A / S · Lersø Parkallé 101 · 2100 Copenhagen Ø