

Tetracyclin Actavis

filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Tetracyclinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Tetracyclin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give Tetracyclin Actavis til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Overblik over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Actavis
3. Sådan skal du tage Tetracyclin Actavis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tetracyclin Actavis er et bredspekret antibiotikum. Du kan bruge Tetracyclin Actavis til behandling af infektioner. Tetracyclin Actavis virker ved at hæmme en række bakterier og andre mikroorganismer.

Lægen kan have givet dig Tetracyclin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Actavis

Tag ikke Tetracyclin Actavis, hvis

- du er overfølsom (allergisk) over for tetracyclin eller et af de øvrige indholdsstoffer
- du er gravid.
- du har dårlige nyrer.
- du er i behandling med kapsler (acitretin eller isotretinoin) mod psoriasis, bumser eller andre hudlidelser. Spørg lægen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Tetracyclin Actavis, hvis du:

- har dårligt fungerende lever eller nyrer.
- har forsnavning i spiserøret, maven eller tarmen.
- får vedvarende hovedpine, smerter bag øjnene eller synsforstyrrelser.
- får diarré.

Behandling med Tetracyclin Actavis kan gøre huden lysfølsom. Under behandlingen bør du derfor undgå direkte eller kunstigt sollys.

Tetracyclin Actavis kan i sjældne tilfælde svække virkningen af p-piller. Du bør derfor bruge en anden sikker præventionsmetode (f.eks. kondom), mens du tager Tetracyclin Actavis. Spørg lægen.

Brug ikke Tetracyclin Actavis, hvis udløbsdatoen er overskredet. For gammel Tetracyclin kan give skader på nyrerne.

Du må kun bruge Tetracyclin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning. Børn, hvis tænder ikke er færdigudviklede, har risiko for varig misfarvning og skade på tænderne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du tager

- medicin mod mavesår (sucralfat).
- produkter, der indeholder zink.
- produkter, der indeholder jernforbindelser.
- medicin mod hjertelidelser (digoxin og quinapril).
- vanddrivende medicin.
- kapsler mod psoriasis eller bumser (isotretinoin og acitretin).
- p-piller.
- anden medicin mod infektion.
- medicin mod HIV-virus (didanosin).
- medicin mod urinsur gigt (probenicid).
- medicin mod manier og depression (lithium).
- medicin mod kræft og visse typer gigt (methotrexat).

Kontakt lægen. Det er måske nødvendigt at ændre dosis.

Hvis du samtidig tager medicin mod for megen mavesyre eller mod forstoppelse, og kosttilskud, der indeholder aluminium, jern, calcium eller magnesium, kan det nedsætte virkningen af Tetracyclin Actavis. Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem du tager Tetracyclin Actavis, og ovennævnte medicin eller kosttilskud.

Brug af Tetracyclin Actavis sammen med mad og drikke

Du må **ikke** tage Tetracyclin Actavis sammen med mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af Tetracyclin Actavis. Der skal gå 3 timer mellem du tager Tetracyclin Actavis og mælkeprodukter.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Tetracyclin Actavis, hvis du er gravid.

Amning

Tetracyclin Actavis bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du ikke tage Tetracyclin Actavis. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tetracyclin Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tetracyclin Actavis

Tabletterne indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Tetracyclin Actavis

Tag altid Tetracyclin Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

1 tablet på 500 mg 2 gange dagligt eller 1 tablet på 250 mg 4 gange dagligt.

Børn:

Du må kun bruge Tetracyclin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning.

Ved svær akne:

Enten 1-2 tabletter på 250 mg eller 1 tablet på 500 mg dagligt gennem flere måneder.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag tabletten sammen med rigelig væske (dog ikke mælk) eller et let måltid uden mælkeprodukter.

Hvis du har taget for mange

Tetracyclin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tetracyclin Actavis, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Tegn på at du har taget for mange Tetracyclin Actavis kan være kvalme, opkastning, og diarré. Hos patienter med dårlige nyrer er der ved overdosering set skader på lever og nyrer.

Hvis du har glemt at tage

Tetracyclin Actavis

Hvis du har glemt en dosis Tetracyclin Actavis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage

Tetracyclin Actavis

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Tetracyclin Actavis.

4. Bivirkninger

Tetracyclin Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

- Mangelfuld udvikling af tandemaljen hos børn. Kontakt læge.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

- Sår eller forsværinger i spiserøret. Kontakt læge.
- Hævelse af ansigt, læber, hals og tunge (angioødem). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

- Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, synsforstyrrelser, smerter bag øjnene). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne til meget sjældne

bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Stærke mavesmerter og vandig, slimet diarré (akut tyktarmsbetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, tendens til infektioner og feber. Søg straks læge.
- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse. Ring 112 (kan være livsfarligt).
- Forværring af bindevævs-lidelsen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus). Kontakt læge.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
- Hvis du har dårlige nyrer, er der risiko for påvirkning af leveren, som viser sig ved gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

- Kvalme, opkastning, diarré, varig misfarvning af børns tandemalje.
- Midlertidig hæmning af knoglernes vækst hos børn.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

- Allergiske hudreaktioner, udslett, nældefeber.
- Øget følsomhed af huden for lys.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Så kan bivirkningerne blive indberettet til Lægemedelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemedelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Tetracyclin Actavis utilgængeligt for børn. Brug ikke Tetracyclin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Afllever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Tetracyclin Actavis filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er tetracyclinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er: Kaliumcarragenan, povidon, glycerol, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, talcum, lactose, hypromellose, macrogol 4000. Farvestoffer: Titandioxid (E171), quinolingult (E104) og jernoxid (E172).

Tetracyclin Actavis' udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tetracyclin Actavis er en rund, gul, hvælvet filmovertrukket tablet med delekræver og mærket "AL" på den ene side.

Pakningsstørrelser

250 mg: 24, 36 og 100 tabletter.
500 mg: 12 og 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group hf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island.

Fremstiller

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland, NE 61 3YA, England

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i marts 2011