

## Dans quel cas le médicament DÉLIPROCT est-il prescrit ?

Ce médicament d'usage local associe un corticoïde anti-inflammatoire et un anesthésique de contact.

Il est utilisé dans le traitement symptomatique des douleurs et des démangeaisons de l'anus, en particulier dues aux hémorroïdes.

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- Hémorroïdes
- Prurit anal (démangeaisons de l'anus)

## Présentations du médicament DÉLIPROCT

**DÉLIPROCT** : suppositoire ; boîte de 6  
Sur ordonnance (Liste I) - Non remboursé - Prix libre

**DÉLIPROCT** : pommade ; tube de 10 g  
Sur ordonnance (Liste I) - Non remboursé - Prix libre

## Composition du médicament DÉLIPROCT

	<b>p suppos</b>	<b>p tube</b>
Prednisolone caproate	1,3 mg	19 mg
Cinchocaïne	1 mg	50 mg

**Substances actives : Cinchocaïne chlorhydrate, Prednisolone caproate**

Aucun excipient commun.

## Contre-indications du médicament DÉLIPROCT

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas d'allergie aux anesthésiques locaux.

### Attention

Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des hémorroïdes et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.

Si la lésion est infectée, un traitement anti-infectieux doit précéder l'usage de ce médicament ou lui être associé.

Sportif : ce médicament contient une substance susceptible de rendre positifs certains tests antidopage.

## Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

## Mode d'emploi et posologie du médicament DÉLIPROCT

- Traitement d'attaque : en cas de crise aiguë, 2 ou 3 suppositoires ou 3 ou 4 applications de pommade, le premier jour.
- Traitement d'entretien : 1 suppositoire ou 1 application de pommade par jour pendant quelques jours.

## Conseils

La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchant des crises d'hémorroïdes. Un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.

Les suppositoires doivent être conservés à l'abri de la chaleur.