

## FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Yasmin 3 mg/0,03 mg comprimidos revestidos por película  
Drospirenona/Etinilestradiol

Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto

1 - O QUE É YASMIN E PARA QUE É UTILIZADO

2 - ANTES DE TOMAR YASMIN

Não tome Yasmin

Tome especial cuidado com Yasmin

Yasmin e trombose

Yasmin e cancro

Hemorragia entre períodos

O que deve fazer se não ocorrer hemorragia na semana de intervalo

Ao tomar Yasmin com outros medicamentos

Análises laboratoriais

Gravidez

Aleitamento

Condução de veículos e utilização de máquinas

Informações importantes sobre alguns componentes de Yasmin

3 - COMO TOMAR YASMIN

Quando pode começar com o primeiro blister

Se tomar mais Yasmin do que deveria

Caso se tenha esquecido de tomar Yasmin

O que deve fazer no caso de vómitos ou diarreia intensa

Atraso no período menstrual: o que deve saber

Alteração do primeiro dia do seu período menstrual: o que deve saber

Se quiser parar de tomar Yasmin

4 - EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

5 - COMO CONSERVAR YASMIN

6 - OUTRAS INFORMAÇÕES

### 1 - O QUE É YASMIN E PARA QUE É UTILIZADO

- Yasmin é uma pílula contraceptiva e é utilizada para prevenir a gravidez.
- Cada comprimido contém uma pequena quantidade de duas hormonas femininas diferentes, nomeadamente a drospirenona e o etinilestradiol.
- As pílulas contraceptivas que contêm duas hormonas são designadas como pílulas “combinadas”.

## 2 - ANTES DE TOMAR YASMIN

### Notas gerais

Antes de começar a tomar Yasmin, o seu médico irá efectuar-lhe algumas perguntas acerca da sua saúde clínica pessoal e da dos seus parentes. O médico irá, igualmente, medir-lhe a sua pressão arterial e, dependendo da sua situação pessoal, poderá também realizar outros testes.

Neste folheto, estão descritas diversas situações em que deverá parar de utilizar Yasmin, ou onde a fiabilidade de Yasmin poderá estar reduzida. Em tais situações, ou não deverá ter relações sexuais ou deverá tomar precauções contraceptivas não-hormonais adicionais como, por exemplo, a utilização de um preservativo ou de outro método de barreira. Não utilize métodos de ritmo ou de temperatura. Estes métodos poderão não ser de confiança porque Yasmin altera as variações mensais da temperatura corporal e do muco cervical.

Yasmin, tal como outros contraceptivos hormonais, não protege da infecção do VIH (SIDA) ou de qualquer outra doença sexualmente transmissível.

### Não tome Yasmin

- se é alérgica ao etinilestradiol ou à drospirenona, ou a qualquer outro componente de Yasmin. Isto pode ser reconhecido pela comichão, erupção cutânea ou inchaço;
- se tem (ou tiver tido no passado) um coágulo sanguíneo (trombose) num vaso sanguíneo da perna, pulmão (embolia) ou noutros órgãos;
- se tem (ou tiver tido no passado) um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral;
- se tem (ou tiver tido no passado) uma doença que possa predispor para um ataque cardíaco (por exemplo, angina pectoris, a qual causa dor intensa no peito) ou para um acidente vascular cerebral (por exemplo, um acidente vascular cerebral ligeiro transitório sem efeitos residuais);
- se tem uma doença que poderá aumentar o risco de uma trombose nas artérias. Isto aplica-se às seguintes doenças:
  - > diabetes com vasos sanguíneos danificados;
  - > pressão sanguínea muito alta;
  - > um nível muito elevado de gordura no sangue (colesterol ou triglicéridos).
- se tem uma perturbação na coagulação sanguínea (por exemplo, deficiência em proteína C);
- se tem (teve) uma certa forma de enxaqueca (com os chamados sintomas neurológicos focais);
- se tem (teve) uma inflamação do pâncreas (pancreatite);
- se tem ou tiver tido no passado uma doença de fígado e a função do seu fígado ainda não está normal;
- se os seus rins não estão a funcionar bem (insuficiência renal);
- se tem ou tiver tido um tumor no fígado;
- se tem (teve) ou se suspeita ter cancro da mama ou cancro dos órgãos genitais;
- se tem qualquer hemorragia inexplicada da vagina.

### Tome especial cuidado com Yasmin

Em algumas situações necessita tomar especial cuidado enquanto utiliza Yasmin ou qualquer outro contraceptivo hormonal combinado, e poderá ser necessário que seja regularmente examinada pelo seu médico. Se qualquer das seguintes condições se aplicar a si, deve informar o seu médico antes de começar a utilizar Yasmin. Se também qualquer das seguintes

situações se desenvolver ou piorar durante a utilização de Yasmin, deve consultar o seu médico:

- se um parente próximo tem ou tiver tido cancro da mama;
- se teve uma doença do fígado ou da vesícula biliar;
- se tem diabetes;
- se tem depressão;
- se tem doença de Crohn ou colite ulcerosa (doença do intestino inflamado);
- se tem síndrome urémica hemolítica (uma doença sanguínea que provoca danos nos rins);
- se tem anemia falciforme (uma doença hereditária dos glóbulos vermelhos);
- se tem epilepsia (ver “Ao tomar Yasmin com outros medicamentos”);
- se tem LES (lúpus eritematoso sistémico; uma doença do sistema imunitário);
- se tem uma doença que primeiro surgiu durante a gravidez ou durante uma utilização antecipada de hormonas sexuais (por exemplo, perda de audição, porfiria (uma doença do sangue), herpes gestacional (erupção cutânea com vesículas durante a gravidez), coreia de Sydenham (uma doença dos nervos em que ocorrem movimentos súbitos do corpo));
- se tem ou alguma vez teve cloasma (manchas pigmentadas castanho douradas, as chamadas “manchas da gravidez”, especialmente na face). Se é este o caso, evite a exposição directa à luz solar ou à luz ultravioleta;
- se tem angioedema hereditário, produtos contendo estrogénios poderão induzir ou piorar sintomas de angioedema. Deverá consultar imediatamente o seu médico se apresentar sintomas de angioedema, tais como face, língua e/ou faringe inchada e/ou dificuldade em engolir ou urticária juntamente com dificuldade em respirar.

Yasmin e trombose

Trombose venosa

A utilização de qualquer pílula combinada, incluindo Yasmin, aumenta o risco de uma mulher desenvolver uma trombose venosa (formação de um coágulo sanguíneo nos vasos) quando comparada com uma mulher que não toma qualquer pílula (contraceptiva).

O risco de trombose venosa em utilizadoras de pílulas combinadas aumenta:

- com o avanço de idade;
- se tem excesso de peso;
- se um dos seus parentes próximos tiver tido um coágulo sanguíneo (trombose) na perna, pulmão ou noutro órgão em idade jovem;
- se tiver que ter uma operação (cirurgia), qualquer período prolongado de imobilização ou se tiver tido um acidente grave. É importante que informe antecipadamente o seu médico de que está a utilizar Yasmin, pois o tratamento poderá ter que ser interrompido. O seu médico dir-lhe-á quando deve reiniciar Yasmin. São geralmente cerca de duas semanas depois de recuperar.

Trombose arterial

A utilização de pílulas combinadas tem sido relacionada com um aumento do risco de trombose arterial (obstrução de uma artéria), por exemplo, nos vasos sanguíneos do coração (ataque cardíaco) ou do cérebro (acidente vascular cerebral).

O risco de trombose arterial em utilizadoras de pílulas combinadas aumenta:

- se fuma. Deve ser fortemente aconselhada a parar de fumar quando utiliza Yasmin, especialmente se tiver mais que 35 anos;
- se tiver um teor acrescido de gordura no sangue (colesterol ou triglicéridos);
- se tem excesso de peso;
- se um dos seus parentes próximos tiver tido um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral em idade jovem;
- se tiver uma pressão sanguínea elevada;
- se tiver enxaquecas;
- se tem um problema com o seu coração (perturbação nas válvulas, uma perturbação do ritmo do coração).

Deixe de tomar Yasmin e contacte o seu médico imediatamente se notar possíveis sinais de trombose, tais como:

- dor intensa e/ou inchaço numa das suas pernas;
- dor súbita intensa no peito que pode atingir o braço esquerdo;
- falta de ar súbita;
- tosse súbita sem causa óbvia;
- qualquer dor de cabeça não habitual, intensa ou persistente ou se uma enxaqueca piorar;
- perda parcial ou completa da visão ou visão dupla;
- dificuldade ou incapacidade para falar;
- tonturas ou desmaios;
- fraqueza, sensação estranha ou dormência em qualquer parte do corpo.

Yasmin e cancro

O cancro da mama tem sido observado com uma frequência ligeiramente maior em mulheres que utilizam pílulas combinadas, mas não se sabe se a diferença é causada pelo tratamento. Por exemplo, pode ser que sejam detectados mais tumores em mulheres que tomem pílulas combinadas porque elas são examinadas mais frequentemente pelo seu médico. A ocorrência de tumores da mama torna-se gradualmente menor depois de parar com os contraceptivos hormonais combinados. É importante que examine regularmente os seus seios e deverá contactar o seu médico se sentir qualquer caroço.

Em casos raros, tumores benignos do fígado, e ainda em menos casos, tumores malignos do fígado, têm sido relatados em utilizadoras de pílula. Contacte o seu médico se tiver dor abdominal intensa não habitual.

Hemorragia entre períodos

Durante os escassos primeiros meses em que toma Yasmin, poderá ter hemorragia não esperada (hemorragia fora da semana de intervalo). Se esta hemorragia durar mais que poucos meses ou se começar após alguns meses, o seu médico deve examinar a causa.

O que deve fazer se não ocorrer hemorragia na semana de intervalo

Se tem tomado correctamente todos os comprimidos, sem a ocorrência de vómitos ou diarreia intensa e se não tomou quaisquer outros medicamentos, é altamente improvável que esteja grávida.

Se não ocorrer a hemorragia esperada duas vezes sucessivas, poderá estar grávida. Contacte imediatamente o seu médico. Não inicie o novo blister até ter a certeza de que não está grávida.

Ao tomar Yasmin com outros medicamentos

Informe sempre o médico, que prescreve Yasmin, que medicamentos ou produtos à base de plantas já está a utilizar. Informe também qualquer outro médico ou dentista que prescreve outro medicamento (ou o farmacêutico que dispensa medicamentos) que está a utilizar Yasmin. Eles podem informar-lhe se necessita de tomar precauções contraceptivas adicionais (por exemplo, preservativos) e, se assim for, por quanto tempo.

- Alguns medicamentos podem tornar Yasmin menos efectivo na prevenção da gravidez, ou podem causar hemorragia inesperada. Incluem-se os medicamentos utilizados para o tratamento:

- > da epilepsia (por ex. primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina);
- > da tuberculose (por ex. rifampicina);
- > de infecções por VIH (ritonavir, nevirapina) ou de outras infecções (antibióticos como a griseofulvina, penicilina, tetraciclina);
- > de pressão sanguínea elevada nos vasos sanguíneos dos pulmões (bosentano);
- > o produto à base de plantas erva de S. João.

- Yasmin poderá influenciar o efeito de outros medicamentos, por ex.:

- > medicamentos que contêm ciclosporina;
- > o anti-epiléptico lamotrigina (poderá levar a um aumento da frequência de convulsões).

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Análises laboratoriais

Se necessitar de uma análise ao sangue, informe o seu médico ou o laboratório de análises de que está a tomar a pílula porque os contraceptivos orais podem influenciar os resultados de algumas análises.

Gravidez

Se está grávida, não deve tomar Yasmin. Se engravidar enquanto toma Yasmin, deve parar imediatamente e contactar o seu médico.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Aleitamento

A utilização de Yasmin geralmente não é aconselhável quando uma mulher está a amamentar. Se desejar tomar a pílula enquanto está a amamentar, deverá consultar o seu médico.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não existe qualquer informação que sugira que a utilização de Yasmin afecta a condução ou utilização de máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Yasmin

Yasmin contém lactose.

Se é intolerante a alguns açúcares, contacte o seu médico antes de tomar Yasmin.

### 3 - COMO TOMAR YASMIN

Tome diariamente um comprimido de Yasmin com um pouco de água, se necessário. Poderá tomar os comprimidos com ou sem alimentos, mas deverá tomar diariamente os comprimidos por volta da mesma hora.

Um blister contém 21 comprimidos. Na proximidade de cada comprimido está impresso o dia da semana em que deverá ser tomado. Se, por exemplo, começar a uma quarta-feira, tome um comprimido junto de “QUA”. Siga a direcção da seta no blister até ter tomado todos os 21 comprimidos.

Nos 7 dias seguintes não tome comprimidos. Durante esses 7 dias sem comprimidos (também chamada semana de paragem ou semana de intervalo) a hemorragia deverá começar. É a chamada “hemorragia de privação” que normalmente começa no 2º ou 3º dia da semana de intervalo.

No 8º dia após o último comprimido de Yasmin (isto é, após o dia 7 da semana de intervalo), comece com o blister seguinte, mesmo se a hemorragia não tiver parado. Isto significa que deverá iniciar a embalagem seguinte no mesmo dia da semana e que a hemorragia de privação deverá ocorrer nos mesmos dias de cada mês.

Se utilizar Yasmin deste modo, está também protegida da gravidez durante os 7 dias em que não toma comprimidos.

Quando pode começar com o primeiro blister

- Se não utilizou um contraceptivo hormonal no mês anterior

Comece a tomar Yasmin no primeiro dia do ciclo (isto é, o primeiro dia da sua menstruação). Se começar Yasmin no primeiro dia da sua menstruação, está imediatamente protegida da gravidez. Poderá também iniciar nos dias 2 a 5 do ciclo, mas nesse caso deve utilizar medidas contraceptivas adicionais (por exemplo, um preservativo) durante os primeiros 7 dias.

- Quando muda de um contraceptivo hormonal combinado, anel vaginal contraceptivo combinado ou de um sistema transdérmico

Pode começar a tomar Yasmin de preferência no dia após o último comprimido activo (o último comprimido que contém substâncias activas) da sua pílula anterior, mas o mais tardar

no dia após terminarem os dias sem comprimidos da sua pílula anterior (ou depois do último comprimido inactivo da sua pílula anterior). Quando se muda de um anel vaginal contraceptivo combinado ou de um sistema transdérmico, siga o conselho do seu médico.

- Quando muda de um método apenas com progestagénio (pílula apenas com progestagénio, injectável, implante ou um Dispositivo de Libertação Intra-Uterino (DLIU) de progestagénio) Poderá mudar em qualquer dia a partir da pílula apenas com progestagénio (a partir de um implante ou de um DLIU no dia em que é retirado, a partir de um injectável quando fosse a altura da seguinte injeção), mas, em todos estes casos, deve utilizar medidas contraceptivas adicionais (por exemplo, um preservativo) para os primeiros 7 dias de toma de comprimidos.

- Após um aborto  
Siga o conselho do seu médico.

- Após um parto  
Após um parto, pode começar a tomar Yasmin entre 21 a 28 dias depois. Se começar mais tarde que os 28 dias, deve utilizar o chamado método de barreira (por exemplo, um preservativo) durante os primeiros sete dias de utilização de Yasmin.

Se, após um parto, tiver tido relações sexuais antes de começar a tomar Yasmin (outra vez), deve, em primeiro lugar, assegurar-se de que não está grávida ou deve esperar até à próxima hemorragia menstrual.

Aconselhe-se junto do seu médico no caso de não ter a certeza quando começar.

- Se estiver a amamentar e quiser começar a tomar Yasmin (outra vez) após um parto  
Leia a secção “Aleitamento”.

Se tomar mais Yasmin do que deveria

Não há relatórios de resultados prejudiciais graves acerca da toma de demasiados comprimidos de Yasmin.

Se tomar muitos comprimidos de uma só vez, então poderá ter sintomas de náuseas ou vómitos. Raparigas jovens poderão ter hemorragia vaginal.

Se tiver tomado demasiados comprimidos de Yasmin, ou se verificar que uma criança tomou alguns, peça aconselhamento ao seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar Yasmin

- Se estiver menos de 12 horas atrasada na toma de um comprimido, a protecção da gravidez não está reduzida. Tome o comprimido logo que se lembre e depois tome os comprimidos seguintes à hora habitual.

- Se estiver mais de 12 horas atrasada na toma de um comprimido, a protecção da gravidez poderá estar reduzida. Quanto maior o número de comprimidos esquecidos, mais elevado é o risco em que protecção da gravidez está reduzida.

O risco de protecção incompleta da gravidez é maior se se esquecer de um comprimido do início ou do fim do blister. Assim, deverá aderir às seguintes regras (veja também o diagrama abaixo):

- Mais de um comprimido esquecido neste blister  
Contacte o seu médico.

- Um comprimido esquecido na semana 1  
Tome o comprimido esquecido logo que se lembre, mesmo que isso signifique tomar dois comprimidos ao mesmo tempo. Tome novamente os comprimidos à hora habitual e utilize precauções adicionais durante os 7 dias seguintes, por exemplo, um preservativo. Se tiver tido relações sexuais na semana anterior ou se tiver esquecido iniciar um novo blister após o período sem comprimidos, deve ter em conta que existe um risco de gravidez. Nesse caso, contacte o seu médico.

- Um comprimido esquecido na semana 2  
Tome o comprimido esquecido logo que se lembre, mesmo que isso signifique tomar dois comprimidos ao mesmo tempo. Tome os comprimidos novamente à hora habitual. A protecção da gravidez não está reduzida e não necessita de tomar precauções adicionais.

- Um comprimido esquecido na semana 3  
Pode escolher entre duas possibilidades:


1. Tome o comprimido esquecido logo que se lembre, mesmo que isso signifique tomar dois comprimidos ao mesmo tempo. Tome os comprimidos novamente à hora habitual. Em vez de cumprir com o período de intervalo, comece logo com o próximo blister.

Muito provavelmente, irá ter um período (hemorragia de privação) no fim do segundo blister, mas poderá também ter spotting ou hemorragia de disrupção durante o segundo blister.

2. Pode também parar o blister e começar imediatamente o período de intervalo de 7 dias (lembre-se do dia em que se esqueceu do seu comprimido). Se quiser iniciar um novo blister no seu dia fixo inicial, faça com que o período de intervalo seja menor que 7 dias.

Se seguir qualquer uma destas duas recomendações, manter-se-á protegida da gravidez.

- Se se esqueceu de qualquer dos comprimidos num blister e não tem hemorragia no primeiro período de intervalo, isto poderá querer dizer que está grávida. Deve consultar o seu médico antes de iniciar o blister seguinte.



O que deve fazer no caso de vômitos ou diarreia intensa

Se vomitar dentro de 3-4 horas após a toma dum comprimido ou se tiver diarreia intensa, existe um risco de as substâncias activas na pílula não serem completamente absorvidas pelo seu organismo. A situação é similar ao esquecimento de um comprimido. Após os vômitos ou a diarreia, deve tomar outro comprimido, assim que possível, de um blister de reserva. Se possível, tome-o dentro das 12 horas do horário em que costuma tomar a sua pílula. Se tal não for possível ou se foram ultrapassadas as 12 horas, deverá seguir o conselho descrito em “Caso se tenha esquecido de tomar Yasmin”.

Atraso no período menstrual: o que deve saber

Apesar de não recomendado, é possível o atraso do seu período menstrual (hemorragia de privação) se começar logo um novo blister de Yasmin, sem passar pelo período de intervalo, até ao fim do segundo blister. Enquanto estiver a tomar o segundo blister, poderá ter spotting (gotículas ou sinais de sangue) ou hemorragia de disrupção. Após o período de intervalo normal de 7 dias, continue com o próximo blister.

Poderá pedir aconselhamento ao seu médico antes de decidir atrasar o seu período menstrual.

Alteração do primeiro dia do seu período menstrual: o que deve saber

Se tomar os comprimidos de acordo com as instruções, então o seu período menstrual/hemorragia de privação iniciar-se-á na semana sem comprimidos. Se tiver que alterar este dia, limite-se a encurtar (mas nunca prolongar!) o período sem comprimidos. Por exemplo, se o seu período sem comprimidos começa a uma sexta-feira e deseja que seja alterado para uma terça-feira (3 dias mais cedo) deve começar um novo blister 3 dias mais cedo que o habitual. Se tornar o período sem comprimidos muito curto (por exemplo, 3 dias ou menos), poderá não ter qualquer menstruação durante este período sem comprimidos. Poderá ter então spotting (gotículas ou sinais de sangue) ou hemorragia de disrupção. Se não tem a certeza de como proceder, peça aconselhamento ao seu médico.

Se quiser parar de tomar Yasmin

Pode parar de tomar Yasmin sempre que quiser. Se não quiser engravidar, aconselhe-se junto do seu médico acerca de outros métodos eficazes de controlo de natalidade.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 4 - EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Yasmin pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

- Efeitos secundários frequentes (afectando mais do que 1 em 100, mas menos do que 1 em 10 mulheres):

Perturbações menstruais, hemorragias entre os períodos, dor mamária, dor de cabeça, sensação de depressão, enxaquecas, sensação de doença, corrimento vaginal esbranquiçado e infecção vaginal por leveduras.

- Efeitos secundários pouco frequentes (afectando mais do que 1 em 1000, mas menos do que 1 em 100 mulheres):

Alterações no interesse em sexo, pressão sanguínea elevada, pressão sanguínea baixa, vômitos, acne, erupção cutânea, comichão intensa, infecção da vagina, retenção de fluidos e alterações de peso corporal.

- Efeitos secundários raros (afectando mais do que 1 em 10000, mas menos do que 1 em 1000 mulheres):

Asma, secreção mamária, perda de audição, bloqueio de um vaso sanguíneo por um coágulo formado em qualquer local do organismo.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto ou se pensa que poderá ser este o caso, informe o seu médico ou farmacêutico.

## 5 - COMO CONSERVAR YASMIN

Manter Yasmin fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 25°C. Conservar na embalagem de origem.

Prazo de validade

Não tome Yasmin após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após “EXP”.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

## 6 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Yasmin

- As substâncias activas são drospirenona e etinilestradiol.

Cada comprimido contém 3 miligramas de drospirenona e 0,030 miligramas de etinilestradiol.

- Outros componentes (excipientes) são lactose mono-hidratada, amido de milho, amido de milho pré-gelatinizado, povidona K25, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol 6000, talco, dióxido de titânio (E171), pigmento de óxido férrico, amarelo (E172).

Qual o aspecto de Yasmin e conteúdo da embalagem

APROVADO EM 03-03-2010 INFARMED
---------------------------------------

- Os comprimidos de Yasmin são comprimidos revestidos por película; o núcleo do comprimido é envolto num revestimento. Os comprimidos são amarelos claros, redondos com faces convexas, com um dos lados gravados com as letras “DO” num hexágono regular.

- Yasmin está disponível em embalagens de 1, 3, 6 e 13 blisters, cada um com 21 comprimidos.

Poderão não ser comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Bayer Portugal, S.A.  
Rua Quinta do Pinheiro, n.º 5  
2794-003 Carnaxide

Fabricante

Bayer Schering Pharma AG  
Berlim, Alemanha

Este medicamento está autorizado nos Estados Membros do EEE com os seguintes nomes:

- Áustria, Bélgica, Chipre, Finlândia, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália,  
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido: Yasmin

- França: Jasmine

Este folheto foi aprovado pela última vez em