

## Daktar kräm

2 % kräm

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.**

- Detta läkemedel är receptfritt. Daktar måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.
- Vänd dig till din **farmaceut** om du behöver mera information eller råd.
- Du måste uppsöka läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:1. VAD ÄR DAKTAR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?2. INNAN DU ANVÄNDER DAKTAR3. HUR DU ANVÄNDER DAKTAR4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR5. FÖRVARING AV DAKTAR

### **DAKTAR 2% KRÄM**

- Det aktiva innehållsämnet är mikonazolnitrat 20 mg per gram.
- Övriga innehållsämnen är pegoxol 7 stearat, oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, bensoesyra (E210), butylhydroxianisol och vatten.

### **Innehavare av försäljningstillstånd**

McNeil Sweden AB, 169 90 Solna

*Tillverkare:* Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien

### **Information lämnas av**

McNeil Sweden AB

169 90 Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info.sweden@conse.jnj.com

## 1. VAD ÄR DAKTAR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

### Läkemedlets utseende:

Daktar är en vit kräm.

### Läkemedelsgrupp

Daktar innehåller ett svampdödande medel (mikonazol) och används vid lokala svampinfektioner i huden.

### Vad används Daktar för?

Daktar är receptfritt vid behandling av fotsvamp.

## 2. INNAN DU ANVÄNDER DAKTAR

### Använd inte Daktar

- om du är överkänslig (allergisk) mot mikonazolnitrat eller något av övriga innehållsämnen i Daktar.
- till barn under 10 år utan läkares ordination. Fotsvamp är ovanligt hos barn.

### Var särskilt försiktig med Daktar

- när du applicerat krämen. Du skall undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling, utom då behandlingen är avsedd för dina händer.
- om du märker att huden blir mer irriterad efter det att du applicerat krämen. Detta kan vara tecken på överkänslighet mot krämen.

Sluta att använda Daktar och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter.

Daktar innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor, samt butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

### Graviditet

Eftersom läkemedlet inte tas upp av kroppen kan Daktar användas under graviditet.

### Amning

Daktar går inte över i modersmjölk.

### Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

## Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller [farmaceut](#) om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Behandling med blodförtunnande medel som tas via munnen, t.ex. [warfarin](#), kan påverkas av Daktar. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.

## 3. HUR DU ANVÄNDER DAKTAR

Använd alltid Daktar enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller [farmaceut](#) om du är osäker. Vanlig [dos](#) är att [krämen](#) stryks tunt på berört område 2 gånger dagligen.

*Vid fotsvamp:* Tvätta och torka fötterna noga. Använd särskild handduk till svampinfekterat område. På så sätt undviker du att smitta andra. Stryk ut [krämen](#) tunt på det infekterade hudområdet och 1-2 centimeter utanför. Massera in så att [krämen](#) försvinner helt. Tvätta händerna efter varje behandling. Detta upprepas morgon och kväll. Byt strumpor varje dag. När huden ser frisk ut igen bör behandlingen fortsätta ytterligare 2 veckor. Det förebygger återfall. Du måste uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandla inte över 4 veckor utan läkares [ordination](#).

Om du upplever att effekten av Daktar är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller [farmaceut](#).

### Om du använder mera Daktar än vad du borde:

- kan huden bli irriterad. Dessa besvär försvinner vanligen då behandlingen avbryts.

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

## 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Daktar ha [biverkningar](#).

*Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):*

Klåda, brännande känsla i huden, reaktioner såsom irritation på administreringsstället. Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter.(angioödem se Var särskilt försiktig med Daktar). Kontaktallergisk hudinflammation, nässelfeber, hudutslag, hudrodnad. Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktiska reaktioner).

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

## **5. FÖRVARING AV DAKTAR**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Se till att tuben är ordentligt tillsluten.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Denna bipacksedel godkändes senast den 2009-09-02