

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Ventoline Diskus

0,2 mg/dos inhalationspulver, avdelad dos / Salbutamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några **biverkningar** blir värre eller om du märker några **biverkningar** som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. VAD VENTOLINE DISKUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER VENTOLINE DISKUS
3. HUR DU ANVÄNDER VENTOLINE DISKUS
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR VENTOLINE DISKUS SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD VENTOLINE DISKUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Ventoline **Diskus** är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör

→ **Läs mer om**

[astma](#) det lättare att andas.

Ventoline **Diskus** används för symtomlindring vid:

- **astma**
- kroniskt **obstruktiv lungsjukdom (KOL)**

Ventoline **Diskus** ska användas för att lindra akuta besvär.

2. INNAN DU ANVÄNDER VENTOLINE DISKUS

Ta inte Ventoline Diskus om:

- du är allergisk (överkänslig) mot **salbutamol** eller mot något av övriga innehållsämnen i Ventoline **Diskus**.

Var särskilt försiktig med Ventoline Diskus

Före behandling med Ventoline **Diskus** påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

- hjärt-kärlsjukdom
- kärlkramp
- ökad sköldkörtelfunktion (**hypertyreos**)
- tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet
- diabetes (sockersjuka)

Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventoline *Diskus*försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade *inhalationer* som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.

Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (*angioödem*):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- *nässelutslag* och andningssvårigheter

Intag av andra läkemedel

Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline *Diskus* och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtrycksmediciner (*beta-blockerare*) kan upphäva effekten av Ventoline *Diskus*.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Ventoline *Diskus* under graviditeten.

Det är okänt om *salbutamol* passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skarpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller *biverkningar*. Beskrivning av dessa effekter och *biverkningar* finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Ventoline Diskus

Ventoline *Diskus* innehåller *laktos* i upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.

3. HUR DU ANVÄNDER VENTOLINE DISKUS

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig *dos* är 1-2 *inhalationer* vid behov. Se Bruksanvisning för mer information.

Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Diskus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vid överdosering kan du få ökad hjärklappning, diarrningar och huvudvärk.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Ventoline Diskus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar indelas i följande kategorier:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

vanliga (fler än 1 person av 100)

mindre vanliga (färre än 1 person av 100)

sällsynta (färre än 1 person av 1000)

mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000)

Vanliga: Diarrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.

Mindre vanliga: Hjärklappning. Irritation i munhåla och svalg.

Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge *rodnad* och värmekänsla i huden.

Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex *klåda* och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s *kangioödem*), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (som tecken på kärlkramp).*

* Om bröstsmärta (som tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.

Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.

Diarrningar och hjärklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker någrabiverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR VENTOLINE DISKUS SKA FÖRVARAS

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid högst 30°C.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Ventoline Diskus är salbutamol. Varje dosinnehåller 0,2 mg salbutamol (som salbutamolsulfat), laktosmonohydrat 12,5 mg.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ventoline Diskus är en formgjuten (blå) plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa.

Ventoline Diskus är förpackad i kartonger i förpackningsstorlekarna 1x60 doser eller 3x60 doser.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Denna bipacksedel godkändes senast den 2009-01-21

Bruksanvisning

Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder VentolineDiskus.

STÄNGD



Ytterhölje

Tumgrepp (för att öppna och stänga inhalatorn)

Inhalatorn öppnas i den här riktningen

ÖPPEN



Ytterhölje
Munstycke
Frammatningsspak
Tumgrepp

Dosräknare
Full 60
Tom 0

Dosräknaren anger hur
många **dos**er som finns
kvar. Siffrorna 5 till 0 är
markerade med RÖTT,
för att varna när inhalatorn snart
är tom.

1. ÖPPNA

Fatta tag om
inhalatorn som
på bilden och för
tumgreppet i pilens
riktning så långt det
går.



2. MATA FRAM

Håll inhalatorn med
munstycket mot dig.
För
frammatningsspaken
från dig, så långt det
går - tills ett klick
hörs.

Ventoline **Diskus** är
nu klar att användas.



3. INHALERA

- Gör en normal utandning.
OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.
- För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen
- Tag bort inhalatorn
- Håll andan 5-10 sekunder
- Andas ut



4. STÄNG

Du stänger inhalatorn genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går.

Ett klicks hörs när inhalatorn stängs.

Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge.

Inhalatorn är klar att användas på nytt.



KOM IHÅG

Förvara inhalatorn vid högst 30°C

Förvara inhalatorn stängd

Andas aldrig ut genom inhalatorn

Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera

Behöver ej rengöras

Överskrid ej ordinerad dosering

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

