

Ventoline Evohaler

0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension

Salbutamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några [biverkningar](#) blir värre eller om du märker några [biverkningar](#) som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. VAD VENTOLINE EVOHALER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER VENTOLINE EVOHALER
3. HUR DU ANVÄNDER VENTOLINE EVOHALER
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR VENTOLINE EVOHALER SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD VENTOLINE EVOHALER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Ventoline Evohaler är ett luftrörsvidgande

→ **Läs mer om**

[astma](#)läkemedel som gör det lättare att andas.

Ventoline Evohaler används för symtomlindring vid

- [astma](#)
- kroniskt [obstruktiv lungsjukdom \(KOL\)](#)

Ventoline Evohaler ska användas för att lindra akuta besvär.

2. INNAN DU ANVÄNDER VENTOLINE EVOHALER

Ta inte Ventoline Evohaler om:

- du är allergisk (överkänslig) mot **salbutamol** eller mot något övrigt innehållsämne i Ventoline Evohaler.

Var särskilt försiktig med Ventoline Evohaler

Före behandling med Ventoline Evohaler påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

- hjärt-kärlsjukdom
- kärlkramp
- ökad sköldkörtelfunktion (**hypertyreos**)
- tillstånd med minskad kalimhalt i blodet
- diabetes (sockersjuka)

*Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventoline Evohaler försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade **inhalationer** som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.*

Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (**angioödem**):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- **nässelutslag** och andningssvårigheter

Intag av andra läkemedel

Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline Evohaler och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtrycksmediciner (**beta-blockerare**) kan upphäva effekten av Ventoline Evohaler.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid användning av Ventoline Evohaler under graviditet.

Det är okänt om **salbutamol** passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU ANVÄNDER VENTOLINE EVOHALER

Följ noga din läkares anvisning hur många doser (puffar) du ska använda dagligen. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är 1-2 inhalationer vid behov, som ska ge lindring vid en akut astmaattack. För barn under 12 år är vanlig dos 1 inhalation vid behov.

Om behandlingen inte ger någon effekt eller att du har behov av flera doser per dygn, kontakta din läkare. Öka aldrig din dos utan att rådfråga din läkare. Se Bruksanvisning för mer information.

Skaka inhalationssprayen före användning.

Ventoline Evohaler inhalationsspray kan användas tillsammans med en andningsbehållare för dem som har svårt att koordinera inhalation och sprayavtryck.

Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Evohaler

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vid överdosering kan du få ökad hjärtklappning, diarréer och huvudvärk.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Ventoline Evohaler orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar indelas i följande kategorier:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

vanliga (fler än 1 person av 100)

mindre vanliga (färre än 1 person av 100)

sällsynta (färre än 1 person av 1000)

mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000)

Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.

Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.

Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge **rodnad** och värmekänsla i huden.

Mycket sällsynta: **Överkänslighetsreaktioner**, t ex **klåda** och hudutslag (nässelfeber), svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s **kangioödem**), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (som tecken på kärlkramp).*

* Om bröstsmärta (som tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.

Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.

Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.

Om några **biverkningar** blir värre eller om du märker **någrabiverkningar** som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR VENTOLINE EVOHALER SKA FÖRVARAS

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid högst 30°C.
- Sätt alltid tillbaka skyddshuven omedelbart efter användning. Du behöver inte använda mycket kraft när skyddshuven trycks på plats tills ett knäpp hörs.
- **Inhalationssprayen** ska skyddas mot frost. Risk för försämrad funktion och effekt när den är kall.
- Innehållet i metallbehållaren är under tryck. Får inte punkteras, brännas eller utsättas för annan åverkan även om behållaren är tom.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Ventoline Evohaler är **salbutamol**. Varje dos innehåller 0,1 mg **salbutamol** (som salbutamolsulfat). Övriga innehållsämnen är norfluran **drivgas** ca 75 mg per dos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ventoline Evohaler **inhalationsspray** är en (blå) plastinhalator med en metallbehållare av aluminium.

Ventoline Evohaler är förpackad i kartong med garantiförslutning i förpackningsstorlek 1 x 200 doser.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Denna bipacksedel godkändes senast den 2011-08-18

Bruksanvisning

Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal bör visa dig hur du ska använda **inhalationssprayen**. Då och då bör de också kontrollera hur du använder den. Det är viktigt att Ventoline Evohaler **inhalationsspray** används rätt och som den ordinerats för att du ska få avsedd effekt på dina luftrörsbesvär.

Metallbehållaren, i plastinhalatorn med munstycke, innehåller läkemedlet.

Så kontrollerar du **inhalationssprayen**

1. Innan du använder **inhalationssprayen** för första gången är det viktigt att testspraya för att kontrollera att sprayen fungerar.

Ta av skyddshuven genom att lätt trycka på båda sidorna mellan tumme och pekfinger samtidigt som du tar av den.

2. För att kontrollera att själva inhalatorn fungerar riktigt skaka **inhalationssprayen** väl, håll munstycket ifrån dig och spraya två gånger i luften. Om du inte använt sprayen under 5 dagar eller mer, ta av skyddshuven, skaka **inhalationssprayen** och spraya två gånger i luften.



Inhalationsteknik

Det är viktigt att andas in så sakta som möjligt innan man använder **inhalationssprayen**.

1. Sitt eller stå när du inhalerar.

2. Ta av skyddshuven (som visas på första bilden). Kontrollera att munstycket är rent på in- och utsidan och fritt från främmande föremål.



3. Skaka inhalatorn 4-5 gånger så att sprayinnehållet blandas och eventuella främmande (lösa) föremål avlägsnas.

4. Håll inhalatorn upprätt med tummen på inhalatorns bas, bakom munstycket. Andas ut lugnt och så djupt som känns bekvämt.



5. Sätt inhalatorn i munnen mellan tänderna. Slut läpparna ordentligt om munstycket. Bit inte i munstycket.



6. Andas in genom munnen. Just när du börjar att andas in, tryck ned toppen på metallbehållaren för att spraya en **dos**. Fortsätt att andas in lugnt och så djupt som möjligt.



8. Om du ska ta ytterligare endos, vänta ungefär en halv minut innan behandlingen upprepas från punkt 3-7.

7. Håll andan, tag bort inhalatorn från munnen och fingret från toppen av metallbehållaren. Fortsätt att hålla andan i några sekunder eller så länge som det känns bekvämt.

9. Sätt alltid tillbaka skyddshuven som skydd mot damm efter att du använt inhalatorn. Ett knäpp hörs när skyddshuven trycks på plats

Kontrollera tekniken framför en spegel de första gångerna. Om det pyser från övre delen av sprayen eller ut genom sidorna av munnen, bör du börja om igen.

Om du eller ditt barn tycker att det är svårt att använda inhalationssprayen, kan en andningsbehållare (Volumatic) underlätta behandlingen. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Rengöring

För att förhindra att inhalatorn 'pluggar igen' är det viktigt att inhalatorn rengörs minst en gång i veckan.

Gör så här:

- Ta av skyddshuven
- Ta inte bort metallbehållaren från plastinhalatorn vid rengöring eller vid något annat tillfälle
- Torka av in- och utsidan av munstycket och plastinhalatorn med en torr duk eller pappersservett
- Sätt tillbaka skyddshuven genom att trycka den på plats tills ett knäpp hörs

Lägg inte metallbehållaren i vatten.